epoca secondo le regole consuete. Le piante che ne provengono si rilevano nei semenzaj, ed al terzo o al quarto anno vi si innestano sopra quelle qualità di peri che si desiderano.

Gli innesti si praticheranno a occhio nel marzo e quanto più le piante sulle quali si faranno, saranno adulte, cioè di oltre i quattro anni, tanto maggiore sarà l'aggradimento a cui giungeranno gli alberi, ma saranno più tardivi a fruttificare.

Le pere bugiarde amano esposizione di levante come molte altre varietà di consimili specie, e di essere difese dai venti marini e dai venti settentrionali, che spesso ne abbruciano le foglie.

Queste pere non sono molto soggette come tante altre ad essere il nido di vermi, ma piuttosto esse marciscono più presto delle altre, e per questo il Micheli le disse più fugaci di tutte.

In vari luoghi d'Italia dove questa pera è comune è detta *brutta buona* (1), *pera malvestita, pera pozzelle, pera gnocca ec.* ed in Spagna dicesi *pera inglese.*

(1) I Piemontesi hanno una pera detta brutta buona che non è questa.

Paolo Morini dis. Gius. Pera inc.

PIRUS COMMUNIS Sacheramanna Aldrov.

Pera Bugiarda

ANTONIO TARGIONI-TOZZETTI *Raccolta di Fiori Fruitti ed Agrumi* FIRENZE, 1825 CHICAGO BOTANIC GARDEN Octavo